

KULLANMA TALİMATI

VOXUS 245 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 245 mg tenofovir disoproksile eşdeğer 300 mg tenofovir disoproksil fumarat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta mikrokristalin selüloz PH 102, kroskarmellos sodyum, magnezyum stearat, hipromeloz, titanyum dioksit (E171), triasetin, FD&C Blue No 2' dir (E 132).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. *VOXUS nedir ve ne için kullanılır?*
2. *VOXUS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *VOXUS nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *VOXUS' un saklanması*

Başlıkları yer almaktadır.

1. VOXUS nedir ve ne için kullanılır?

VOXUS, karton kutu içerisindeki, LDPE tamper evident emniyet çemberli alüminyum sealing içeren beyaz kapak, 2 gr silikajel kapsül içeren, HDPE Opak şişede 30 film kaplı tablet olarak ambalajlanır. VOXUS, mavi renkli, bir yüzü Sanovel logolu, bikonveks, elmas şeklinde film kaplı tabletlerdir.

VOXUS, yetişkinlerde bir hepatit B virüsünün (HBV) etken olduğu kronik hepatiti tedavi etmek için kullanılır.

VOXUS, ayrıca 18 yaş üstü yetişkinlerde İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonuna yönelik bir tedavidir.

Hepatit B virüsü (HBV) açısından VOXUS'la tedavi edilmek için HIV enfeksiyonunuzun olması gerekmez.

VOXUS, etkin madde olarak tenofovir disoproksil içerir. Bu etkin madde, hepatit B virüsünü veya HIV ya da her ikisini tedavi etmek için kullanılan antiviral veya antiretroviral bir ilaçtır. Tenofovir, genellikle NRTI olarak bilinen bir nükleotid revers transkriptaz inhibitörüdür ve virüslerin kendilerini yeniden üretmesi için esas olan enzimlerin (hepatit B'de DNA polimeraz,

HIV’de revers transkriptaz;) normal alıřmasını engelleyerek alıřır. HIV’de, VOXUS, HIV enfeksiyonunu tedavi etmek iin her zaman diđer ilalarla kombine halde kullanılmalıdır.

Bu ila, HIV enfeksiyonunun aresi deđildir. VOXUS’u alırken, yine HIV enfeksiyonu ile iliřkili enfeksiyonlar veya bařka hastalıklar geliřtirebilir.

Ayrıca bařkalarına da HIV veya HBV bulařtırabilirsiniz; dolayısıyla, bařkalarını enfekte etmekten kaınmak iin nlemler alınması nemlidir.

2. VOXUS’u Kullanmadan nce Dikkat Edilmesi Gerekenler

VOXUS’u ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

- Tenofovir disoproksil fumarat veya bu kullanma talimatının bařında sıralanan VOXUS’un diđer bileřenlerinden herhangi birine karřı **alerjik** (ařırı duyarlı) iseniz.

Bu sizin iin geerliyse, hemen doktorunuza syleyiniz.

VOXUS’u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- **Bbrek hastalıđınız varsa veya testlerde bbreklerinizde sorunlar olduđu grldyse doktorunuza syleyiniz.** VOXUS bbreklerinizi etkileyebilir. Tedaviye bařlamadan nce, doktorunuz, bbrek fonksiyonunuzu deđerlendirmek iin kan testleri isteyebilir veya tabletleri daha az sıklıkta almanızı tavsiye edebilir. Doktorunuz ayrıca bbreklerinizi izlemek iin tedavi sırasında kan testleri de isteyebilir.

VOXUS genellikle bbreklerinize zarar verebilecek bařka ilalarla birlikte alınmaz (Bkz. Diđer ilalar ile birlikte kullanım). Bu kaınılmazsa, doktorunuz bbrek fonksiyonunuzu haftada bir izleyecektir.

- **65 yařın zerindeyseniz doktorunuzla konuřun.** VOXUS, 65 yař st hastalarda incelenmemiřtir. Bu yařın zerindeyseniz ve size VOXUS reete edilmiřse, doktorunuz sizi dikkatle izleyecektir.
- **ocuklara ve 18 yař altı genlere VOXUS vermeyiniz.**
- **Hepatit dahil karaciđer hastalıđı hikayeniz varsa doktorunuzla konuřunuz.** Kronik hepatit B veya C dahil karaciđer hastalıđı bulunan ve antiretrovirallerle tedavi edilen hastalar, řiddetli ve potansiyel olarak lmcl karaciđer komplikasyonları aısından daha yksek risk altındadır. Hepatit B enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz sizin iin en iyi tedavi rejimini dikkatle deđerlendirecektir. Karaciđer hastalıđı veya kronik hepatit B enfeksiyonu hikayeniz varsa, doktorunuz, karaciđer fonksiyonunuzu dikkatle izlemek iin kan testleri yapabilir.

Doktorunuzun tavsiyesi olmadan VOXUS’u almayı kesmeyiniz. VOXUS’u bıraktıktan sonra, tedavinin kesilmesinin ardından fark ettiđiniz tm yeni, olađandışı veya ktleřen belirtileri hemen doktorunuza syleyiniz. Sizde hepatit B (mono enfeksiyon) veya aynı anda hepatit B ve HIV (ko-enfeksiyon) varsa, bazı hastalarda, VOXUS tedavisini kestikten sonra hepatitlerinin ktleřtiđini gsteren belirtiler veya kan testleri bulunmaktadır. VOXUS tedavisi kesildikten sonra doktorunuzun sađlıđınızı izlemesi en iyisidir. Tedavi kesildikten sonra birkaç ay kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

- **VOXUS’u almaya bařladıktan sonra, olası laktik asidoz belirtilerine dikkat ediniz.** VOXUS karaciđer bymesiyle birlikte laktik asidoza (kanınızda laktik asit fazlası) yol aabilir. Hayvanlardaki ve insanlardaki veriler, VOXUS tedavisi sırasında laktik asidoz

görülme riskinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Derin ve hızlı nefes alıp verme, uyuşukluk ve bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi özel olmayan belirtiler laktik asidoz gelişimine işaret edebilir. Bu nadir, ancak ciddi yan etki bazen ölümcül olmaktadır. Nükleozid analoglarının neden olduğu laktik asidoz daha sık kadınlarda özellikle de aşırı kilolularda görülmektedir. Karaciğer hastalığınız varsa, bu rahatsızlığa daha yüksek yakalanma riski altında da olabilirsiniz. VOXUS'la tedavi edilirken, doktorunuz, laktik asidoz gelişimine dair tüm belirtiler açısından sizi yakından izleyecektir.

- **Başkalarını enfekte etmemeye dikkat edin.** VOXUS, cinsel temas veya kan yoluyla başkalarına Hepatit B virüsü (HBV) veya HIV bulaştırma riskini azaltmaz. Bundan kaçınmak için önlemler almaya devam etmelisiniz.

Diğer önlemler

HIV tedavisinde, antiretroviral kombinasyon tedavileri (VOXUS dahil) kan şekerini yükseltebilir, kandaki yağları artırabilir (hiperlipemi), vücut yağı dağılımında değişimlere ve insüline karşı dirence bağlı kan şekerinin yükselmesine yol açabilir (Bkz. Bölüm 4. Olası yan etkiler).

Diyabetiniz varsa, aşırı kiloluysanız veya kolesterolunuz yüksekse, doktorunuzla konuşunuz.

Enfeksiyonlara dikkat ediniz. İlerlemiş HIV enfeksiyonunuz (AIDS) veya bir enfeksiyonunuz varsa, VOXUS tedavisine başladıktan sonra iltihabi belirtiler ortaya çıkabilir veya varolan iltihabi belirtilerde kötüleşme görülebilir. Bu belirtiler, vücudunuzun iyileşmiş immün sisteminin enfeksiyonla savaştığına işaret edebilir. VOXUS'u almaya başladıktan hemen sonra iltihabi belirtilere dikkat edin. İltihabi belirtileri fark ederseniz, **hemen doktorunuza söyleyiniz.**

Kemik sorunları. Kombine antiretroviral tedavi alan bazı HIV hastalarında osteonekroz (kemik kanlanması kaybı sonucu kemik dokusunun ölümü) görülebilir. Diğerlerinin yanı sıra antiretroviral kombinasyon tedavisinin uzunluğu, kortikosteroid kullanımı, alkol tüketimi, şiddetli immünosupresyon ve yüksek vücut kütle indeksi osteonekrozun görülmesinde pek çok risk faktöründen birkaçı olabilir. Osteonekroz belirtileri eklemlerde sertlik, sıızı ve ağrı (özellikle kalça, diz ve omuzda) ve hareket güçlüğüdür. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Doktorunuzla görüşmeden tedavinizi kesmeyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

VOXUS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

- **VOXUS, yiyeceklerle beraber veya aç karnına alınabilir.**

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Doktorunuzla özel olarak görüşmediğiniz sürece VOXUS'u gebelik sırasında **almamalısınız.** VOXUS'un gebe kadınlarda kullanımıyla ilgili klinik veri bulunmamaktadır ve genellikle kesin gerekli olmadığı sürece kullanılmaz.
- VOXUS tedavisi sırasında gebe kalma olasılığınız varsa, gebe kalmamak için etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanmalısınız.

- Gebe kalırsanız veya gebe kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza antiretroviral tedavinizin siz ve çocuğunuz üzerindeki olası faydalarını ve risklerini sorunuz.

Gebeliğiniz sırasında VOXUS'u aldıysanız, doktorunuz çocuğunuzun gelişimini izlemek için düzenli kan testleri ve başka tanısal testler isteyebilir. Gebeliği sırasında NRTI alan annelerin çocuklarında, virüse karşı korumadan sağlanan fayda yan etki riskine ağır basmıştır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- **VOXUS tedavisi sırasında emzirmeyiniz.** Bu ilaçtaki etkin maddelerin insan sütüne geçip geçmediği henüz bilinmemektedir.
- Hepatit B virüsü (HBV) olan veya HIV'li bir kadınsanız, virüsü anne sütüyle bebeğe geçirmemek için emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı:

VOXUS baş dönmesine yol açabilir. VOXUS'u alırken başınızın döndüğünü hissederseniz, **araç sürmeyiniz** ve herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.

VOXUS'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Laktoza veya diğer şekerlere intoleransınız varsa doktorunuza söyleyiniz. VOXUS, laktoz monohidrat içerir. Laktoza karşı intoleransınız olduğunuzu biliyorsanız veya diğer şekerlerden herhangi birine intoleransınız olduğu size söylendiyse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Tenofovir disoproksil fumarat içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız, **VOXUS'u almamalısınız.** VOXUS ve Hepsera'yı (adefovir dipivoksil) aynı anda almamalısınız.

- **Böbreklerinize zarar verebilecek başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir.**

Bu ilaçlara aşağıdakiler dahildir:

- aminoglikozidler (bakteriyel enfeksiyon için)
 - amfoterisin B (mantar enfeksiyon için)
 - foskarnet (viral enfeksiyon için)
 - gansiklovir (viral enfeksiyon için)
 - pentamidin (enfeksiyonlar için)
 - vankomisin (bakteriyel enfeksiyon için)
 - interlökin-2 (kanser tedavinde kullanılır)
 - sidofovir (viral enfeksiyon için)
 - adefovir dipivoksil (HBV için)
 - takrolimus ve siklosporin (immün sistemin supresyonu için)
- **Didanozin içeren diğer ilaçlar (HIV enfeksiyonu için):** VOXUS'un didanozin içeren diğer antiviral ilaçlarla birlikte alınması kanınızdaki didanozin düzeylerini yükseltebilir ve CD4 hücre sayımlarını düşürebilir. Tenofovir disoproksil fumarat ve didanozin içeren ilaçlar

birlikte alındığında nadiren, bazen ölüme neden olan pankreas enflamasyonu ve laktik asidoz (kanda laktik asit fazlası) rapor edilmiştir. Doktorunuz sizi tenofovir ve didanozin kombinasyonları ile tedavi edip etmeme konusunu dikkatle değerlendirecektir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VOXUS Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- **Yetişkinler:** Her gün bir tablet.

Uygulama yolu ve metodu:

Yiyeceklerle beraber veya aç karnına alınabilir.

Yutmada zorluk çekiyorsanız, tableti ezmek için bir kaşığın ucunu kullanabilirsiniz.

Ardından, tozu yaklaşık 100 ml (yarım bardak) su, portakal suyu veya üzüm suyu ile karıştırın ve hemen için.

- **VOXUS'u her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız.** Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla kontrol etmelisiniz.
- **Her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız.** Bu, ilacınızın tamamen etkili olduğundan emin olmak ve tedaviye karşı direnç geliştirme riskini azaltmak içindir. Doktorunuz söylemediği sürece dozu değiştirmeyiniz.
- **Sizde HIV varsa, doktorunuz VOXUS'u diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte reçete edecektir.** Sizde hem Hepatit B virüsü (HBV) hem de HIV (ko-enfeksiyon) varsa,

VOXUS'u doktorunuzun reçete ettiği diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte almanız önemlidir. Hepatit B hastasıysanız, doktorunuz, hem hepatit B virüsü hem de HIV virüsünün bulunup bulunmadığını görmek için HIV testi yaptırmanızı önerebilir.

Bu ilaçların nasıl alınacağı ile ilgili kılavuz bilgiler için lütfen diğer antiretrovirallerin hasta kullanma talimatlarına bakın.

Değişik yaş grupları :

- **Çocuklarda kullanım: Çocuklar ve gençler için değildir.**

Özel kullanım durumları:

- **Böbreklerinizde sorunlar varsa,** doktorunuz VOXUS'u daha az sıklıkta almanızı tavsiye edebilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VOXUS kullandıysanız:

VOXUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız tavsiye için bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya en yakındaki acil servisle görüşünüz. Ne aldığınızı kolayca açıklayabilmeniz için tablet şişesini yanınızda bulundurunuz.

VOXUS kullanmayı unutursanız:

VOXUS dozunun atlanmaması önemlidir. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

VOXUS **dozunu atladıysanız**, olabildiğince kısa süre içinde alın ve sonraki dozunuzu da zamanında alınız.

Neredeyse sonraki dozunuzun zamanı geldiyse, atladığınız dozu ihmal ediniz. Bekleyiniz ve sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VOXUS'u aldıktan sonra 1 saatten az bir süre içinde kusarsanız, başka bir tablet alın. VOXUS'u aldıktan sonra 1 saatten fazla bir süre içinde hastalanırsanız, başka bir tablet almanıza gerek yoktur.

VOXUS'u almayı keserseniz

- Doktorunuzun tavsiyesi olmadan VOXUS'u almayı kesmeyin. VOXUS tedavisini kesmek, doktorunuzun önerdiği tedavinin etkinliğini azaltabilir. Herhangi bir nedenle VOXUS'u almayı kesmeden önce, özellikle de yan etkiler yaşıyorsanız veya başka bir hastalığınız varsa doktorunuzla konuşun. VOXUS tabletlerini yeniden almaya başlamadan önce doktorunuzla görüşün.

Sizde hepatit B veya aynı anda HIV ve hepatit B (ko-enfeksiyon) varsa, ilk önce doktorunuzla konuşmadan VOXUS tedavinizi kesmemek özellikle önemlidir. Bazı hastalarda, VOXUS'u kestikten sonra hepatitlerinin kötüleştiğini gösteren kan testleri veya belirtiler bulunmuştur. Tedavi kesildikten sonra birkaç ay kan testleri yaptırmanız gerekebilir (Bkz. Bölüm 2.).

Tedaviyi kestikten sonra, özellikle hepatit B enfeksiyonu ile ilişkilendirdiğiniz belirtiler olmak üzere yeni veya olağandışı belirtileri hemen doktorunuza söyleyin.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası Yan Etkiler

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, VOXUS, herkeste görülmesi de yan etkilere yol açabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birinin görülmesi durumunda doktorunuza söyleyin:

Çok yaygın görülen yan etkiler

(Bunlar, tedavi edilen her 100 hastadan en az 10 hastayı etkileyebilir)

- ishal, kusma, bulantı, baş dönmesi

Testler ayrıca şunları da gösterebilir:

- kandaki fosfat değerlerinde azalma

Yaygın görülen yan etkiler

(Bunlar, tedavi edilen her 100 hastadan 1 ila 10 hastayı etkileyebilir)

- gaz

Seyrek görülen yan etkiler

(Bunlar, tedavi edilen her 10,000 hastadan en az 1 hastayı; ancak tedavi edilen her 1,000 hastada 1 hastadan azını etkileyebilir)

- laktik asidoz (kanda laktik asit fazlası, ölümcül olabilen ciddi bir yan etki). Aşağıdaki yan etkiler laktik asidoz belirtileri olabilir:
 - derin hızlı nefes alıp verme
 - uyuşukluk
 - bulantı, kusma ve mide ağrısı

Sizde laktik asidoz olabileceğini düşünüyorsanız, hemen doktorunuzla görüşün.

Seyrek görülen diğer yan etkiler

- karında pankreas enflamasyonunun yol açtığı ağrı

- b6brek yetmezlięi dahil, b6brek sorunlarının yol atıęı idrarınızın miktarında artıř, susuzluk ve sırt aęrısı
- d6k6nt6

Testler ayrıca řunları da g6sterebilir:

- kanınızdaki kreatininde artıř
- karacięer ve pankreas sorunları

ok seyrek g6r6len yan etkiler

(Bunlar, tedavi edilen her 10,000 hastada 1'den az hastayı etkileyebilir)

- nefes darlıęı
- karında karacięer enflamasyonunun yol atıęı aęrı
- g6s6z hissetme

Testler ayrıca řunları da g6sterebilir:

- b6brek t6b6l h6crelerinde hasar

Dięer olası etkiler

Ayrıca, kas aęrısı veya zayıflıęı ve kemik mineral kaybına baęlı olarak kemiklerin g6s6zleřmesi (her ikisi de b6brek sorunlarıyla iliřkili), b6breklerde enflamasyon, ok fazla idrara ıkma ve susama hissi yařayabilirsiniz.

HIV tedavisinde, antiretroviral kombinasyon tedavisi (VOXUS dahil), v6cut yaęının daęılma řeklini deęiřtirerek v6cut řeklinizde deęiřiklięe neden olabilir. Bacaklarınızdan, kollarınızdandan ve y6z6n6zden yaę kaybedebilirsiniz, karın ve i organların civarı yaęlanabilir, g6ę6sleriniz b6y6yebilir veya boynunuzun arkasında yaę yumruları (“buffalo kamburu”) oluřabilir. Bu deęiřikliklerin nedeni ve uzun vadede etkileri hen6z bilinmemektedir.

HIV tedavisinde, antiretroviral kombinasyon tedavisi hiperlipidemiye (kandaki yaęlarda artıř) ve ins6line karřı dirence baęlı kan řekerinin y6kselmesine yol aabilir. Doktorunuz bu deęiřiklikler iin test uygulayacaktır.

Yan etkilerden herhangi biri ciddileřirse veya bu kullanma talimatında sıralanmayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, l6tfen doktorunuza s6yleyin.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuřunuz. Ayrıca karřılařtıęınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İla Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak T6rkiye Farmakovijilans Merkezi (T6FAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduęunuz ilacın g6venlilięi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı saęlamıř olacaksınız.

5. VOXUS'un Saklanması

VOXUS'u ocukların g6remeyeceęi, eriřemeyeceęi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

VOXUS'u, 25°C'nin altındaki oda sıcaklıęında saklayınız.

řiře ve kutu 6zerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra VOXUS'u kullanmayın. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son g6n6n6 ifade eder.

İlalar atık su aracılıęıyla veya ev atıęı řeklinde imha edilmemelidir. Eczacınıza artık gerek duyulmayan ilaların nasıl imha edileceęini sorun. Bu 6nlemler evrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34460 İstinye-İstanbul

Üretim yeri: Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatı 10.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

