

KULLANMA TALİMATI

CILOXAN® Steril Oftalmik Pomad, 3.5 gr

Göze sürülerek uygulanır.

- **Etkin madde:** 3.5 mg siprofloksasin hidroklorür (3.0 mg siprofloksasin bazına eş değer)
- **Yardımcı maddeler:** 20.0 mg mineral yağ ve 1.0 mg beyaz vazelin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **CILOXAN® Steril Oftalmik Pomad nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CILOXAN® Steril Oftalmik Pomad'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CILOXAN® Steril Oftalmik Pomad nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CILOXAN® Steril Oftalmik Pomad'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. **CILOXAN® Steril Oftalmik Pomad nedir ve ne için kullanılır?**

Farmakoterapötik grup: Oftalmolojikler, antiinfektifler, diğer antiinfektifler

CILOXAN gözlerin çevresindeki yüzeysel infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

CILOXAN antiinfektifler olarak adlandırılan **ilaç grubunun bir üyesidir.** Gözü/gözleri infekte eden geniş bir aralıktaki mikroorganizmalara karşı da etkin olan kinolonlar antiinfektifler grubuna dahil ilaçlardır. Siprofloksasin de bir kinolondur.

CILOXAN beyaz-kırık beyaz bir homojen pomadır.

3.5 gr'lık bir adet tüp içeren kutularda sunulmaktadır.

2. CILOXAN® Steril Oftalmik Pomad'ımı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CILOXAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer siprofloksasine veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı **hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise**
- Eğer diğer kinolonlara karşı **hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise**

CILOXAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

- **Eğer ciddi seviyede** göz kapağında kaşınma, şişme, gözde kanlanma oluşursa ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza danışın.
- **Bu ilacı** doktorun size reçete ettiği sürece **kullanın**. Antibakteriyel ilaçların uzun süre kullanımı süperinfeksiyon ile sonuçlanabilir.
- **Diğer göz pomadı uygulamalarında olduğu gibi**, gözünüzdeki yaranın iyileşmesi gecikebilir.
- Gözde infeksiyon olduğunda **kontakt lens takmamalısınız**.
- Kontakt lens kullanıyorsanız lensler gözünüzde iken pomadı kullanmayınız.

CILOXAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

CILOXAN gözde kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

CILOXAN kullandıktan görüşünüzde bulanıklaşma olursa bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CILOXAN® Steril Oftalmik Pomad nasıl kullanılır?

CILOXAN'ı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Korneal ülserlerde, ilk iki gün hasta gözün/gözlerin konjunktival kesesine 1-2 saatte bir, takip eden 12 gün boyunca her 4 saatte bir 1.25 cm.lik şeritler halinde uygulanır.

Gözün/gözlerin ve çevresinin yüzeysel infeksiyonlarında doz hasta gözün/gözlerin konjunktival kesesine (veya göz kapağı kenarına, sırasıyla) ilk iki gün üç kez sonraki beş gün iki kez 1.25 cm.lik şeritler uygulanır.

Genellikle tedavi süresi 7-14 gündür. **Tedavinizin ne kadar daha süreceğini size doktorunuz söyleyecektir.**

CILOXAN'ı **sadece** gözlerinize kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu



1. CILOXAN tüpünü ve bir ayna alınız.
2. Ellerinizi yıkayınız.
3. Kapağı açınız.
4. Tüpü başparmağınız ve işaret parmağınızla tutunuz.
5. Başınızı arkaya doğru itiniz. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya kadar temiz bir parmağınızın yardımıyla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz. Pomad bu alana sürülecektir (resim 1).
6. Tüpün ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.
7. **Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere tüpün ucunu dokundurmeyiniz.** Pomada mikrop bulaştırabilir.
8. Pomaddan şeridin çıkması için tüpü hafifçe sıkınız (resim 2).
9. CILOXAN'ı kullandıktan sonra, alt göz kapağınızı serbest bırakınız, bir süre gözünüzü kırparak pomadın tüm göze yayıldığından emin olunuz. Gözlerinizi bir süre için kapatınız; bu, CILOXAN'ın vücudun geri kalanına geçmesini engeller.
10. Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
11. Kullandıktan hemen sonra tüpün kapağını sıkıca kapatınız.
12. Her defasında sadece bir tüp kullanınız.

Eğer pomadı gözünüzün dışına kaçırsanız tekrar deneyiniz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CILOXAN kullandıysanız:

Eğer gerekirse, gözünüzü/gözlerinizi ılık su ile yıkayarak CILOXAN'ı uzaklaştırabilirsiniz.

CILOXAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CILOXAN'ı kullanmayı unutursanız:

Hatırladığınız anda tek bir doz sürünüz. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulmuş dozu almayı düzenli doz programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Eğer başka göz ilaçları kullanıyorsanız, birbirini takip eden uygulamalar arasında on ila onbeş dakika bırakınız ve pomadı en son sürünüz.

Bu ürünün kullanımı için başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CILOXAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan CILOXAN kullanımını kesmeyiniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan (her 1000 kişide yaklaşık 1 ila 10 kişiyi etkileyebilir):
tat bozukluğu

Göz bozuklukları

Yaygın (her 100 kişide yaklaşık 1 ila 10 kişiyi etkileyebilir):
rahatsızlık, beyaz çökelti* (kornea ülserli hastalarda ve sık uygulama sonucu)

Yaygın olmayan (her 1000 kişide yaklaşık 1 ila 10 kişiyi etkileyebilir):
bulanık görme, kızarıklık, kaşıntı, görme keskinliğinde azalma, ağrı, göz yaşarması, ışığa karşı duyarlılık ve göz kuruluğu.

*Kornea ülserli ve bu tıbbi ürünün sık uygulandığı hastalarda, beyaz çökelti gözlenmiş, ancak CILOXAN uygulamasına devam edilmesi halinde bu çökelti çözülmüştür. Çökelti, CILOXAN kullanımına devam edilmesini engellememesinin yanı sıra, ülserin veya görme durumunun klinik seyrine ters bir etki yapmamaktadır. Çökeltinin başlangıcı, tedavinin başlangıcından itibaren 24 saat ila 7 gün arasında oluşmuştur. Bu çökeltinin çözülmesi tedavi başlangıcının hemen sonrasında 13 güne kadar değişkenlik göstermiştir.

Bunlar CILOXAN'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildirin.

5. CILOXAN® Steril Oftalmik Pomad'ın saklanması

CILOXAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. *Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CILOXAN'ı kullanmayınız. Tüpü açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.*

Açıldığı tarih:

Kullanmadığınız zaman tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Tüp ilk kez açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır.

İlacınızı evdeki çöpinüze atmayınız. İhtiyacınız olmayan ilacın atılma koşullarını eczacınıza danışınız. Bu durum, çevreyi korumaya yardım edecektir.

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi 'Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Mrk. No: 12 C-Blok K:5 Kavacık 34805 Beykoz / İSTANBUL adresindeki Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.'

Üretici 'Rijksweg 14, 2870 Puurs / Belçika adresindeki s.a. Alcon Couvreur n.v.'

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.

Bu kullanma talimatının onaylandığı gün ay ve yıl: